

## Informace o nově zavedeném vyšetření spalniček

Z důvodu aktuální epidemiologické situace začala naše laboratoř vyšetřovat protilátky proti spalničkám (morbilli, measles) ve třídě IgG a IgM.

V současné době se doporučuje vyšetření protilátek IgG u rizikových osob (např. zdravotníků, kontaktů s nemocnými), kde jejich nepřítomnost i u dříve očkovaných osob může být indikací k opakovanému přeočkování.

Vyšetření protilátek IgM je doporučováno pouze v případě klinických projevů – nejlépe od 4. do 28. dne po výsevu exantému.

Vyšetření provádíme **denně** metodou chemiluminiscence a jen **ve třídě IgG**.

**Na žádance o vyšetření zaškrtněte políčko „Morbilli“.** Při požadavku na vyšetření také IgM protilátek dopište „+ IgM“ do kolonky morbilli:



Exantematické viry	
<input type="checkbox"/>	Rubeola
<input type="checkbox"/>	Varicella - zoster
<input checked="" type="checkbox"/>	Morbilli + IgM

Případné další informace k vyšetření spalniček vám ochotně poskytneme:

MUDr. Kateřina Wezdenková  
Laboratoře Mikrochem a.s.  
Nerudova 34  
787 01 Šumperk  
Telefon: +420 583 301 275  
[katerina.wezdenkova@michem.cz](mailto:katerina.wezdenkova@michem.cz)  
<http://www.michem.cz/>

Přehledné informace k vyšetření:

Požadované vyšetření	Protilátka	Použitá metoda	Biologický materiál	Hodnocení	Provádí se	Doba odezvy (pracovní dny)
<i>Virus spalniček</i>	IgM	CMIA	srážlivá krev / sérum	index positivity: negativní: <0,9 hraniční: 0,9-1,1 pozitivní: >1,1	denně	2
	IgG		srážlivá krev / sérum	AU/ml negativní: <13,5 hraniční: 13,5-16,5 pozitivní: >16,5	denně	2

Vysvětlivky:

CMIA Chemiluminiscent microparticle immunoassay